



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of KURUNG-KUMEY(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	21.0	10.0	70	35	5.1	289	6
2020-03-19	2.0	21.0	10.0	74	39	5.2	289	6
2020-03-20	10.0	20.0	9.0	88	35	5.1	289	8
2020-03-21	12.0	20.0	9.0	83	38	5.6	292	8
2020-03-22	1.0	22.0	11.0	74	36	4.1	292	6

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 20.0-22.0°C and 9.0-11.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 70-88% and 35-39% respectively. Wind direction is mainly WNW with average wind speed range of 4.1-5.6 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 20.0-22.0°C, न्यूनतम 9.0-11.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 70-88 प्रतिशत और 35-39 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.1-5.6 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: WNW |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MUSTARD	1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination
	1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation
	1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
APPLE	1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free
	1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
--------------------	---------------------------

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of LOHIT(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	26.0	14.0	37	19	6.8	64	0
2020-03-19	0.0	26.0	14.0	38	18	6.8	68	0
2020-03-20	1.0	25.0	13.0	34	18	6.6	64	4
2020-03-21	0.0	25.0	14.0	28	17	7.2	68	3
2020-03-22	0.0	25.0	15.0	34	17	5.6	64	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 25.0-26.0oC and 13.0-15.0oC respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 28-38% and 17-19% respectively. Wind direction is mainly ENE with average wind speed range of 5.6-7.2 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 25.0-26.0oC, न्यूनतम 13.0-15.0oC। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 28-38 प्रतिशत और 17-19 प्रतिशत होगा, पवन गति: 5.6-7.2 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: ENE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MAIZE	<p>Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.</p> <p>बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	<p>1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.</p> <p>1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।</p>
POTATO	<p>1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves</p> <p>1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	<p>Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.</p>

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Complex Branch
Umiam, Meghalaya



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of LONGDING(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	27.0	17.0	58	30	6.6	18	6
2020-03-19	0.0	28.0	18.0	57	29	6.4	22	6
2020-03-20	2.0	27.0	17.0	53	29	6.8	120	6
2020-03-21	0.0	28.0	17.0	57	29	7.1	34	5
2020-03-22	0.0	29.0	18.0	54	29	6.6	22	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 27.0-29.0°C and 17.0-18.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 53-58% and 29-30% respectively. Wind direction is mainly NNE with average wind speed range of 6.4-7.1 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 27.0-29.0°C, न्यूनतम 17.0-18.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 53-58 प्रतिशत और 29-30 प्रतिशत होगा, पवन गति: 6.4-7.1 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MAIZE	Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.
	बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.
	1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।
POTATO	1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves
	1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of LOWER-DIBANG-VALLEY(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	26.0	14.0	59	26	5.5	11	1
2020-03-19	0.0	26.0	14.0	61	27	5.4	349	1
2020-03-20	18.0	24.0	12.0	60	27	5.8	25	8
2020-03-21	8.0	24.0	13.0	50	26	6.4	22	8
2020-03-22	2.0	25.0	15.0	59	28	4.9	11	7

Weather Summary/Alert:

Mostly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 24.0-26.0°C and 13.0-15.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 50-61% and 26-28% respectively. Wind direction is mainly NNE with average wind speed range of 4.9-6.4 kmph.

मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 24-0-26.0°C, न्यूनतम 13.0-15.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 50-61 प्रतिशत और 26-28 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.9-6.4 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्ग को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MAIZE	Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.
	बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.
	1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।
POTATO	1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves
	1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Complex Branch
Umiam, Meghalaya



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of NAMSAI(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	27.0	17.0	49	24	3.4	117	6
2020-03-19	0.0	28.0	18.0	49	25	3.4	292	6
2020-03-20	2.0	27.0	17.0	45	23	4.2	112	6
2020-03-21	0.0	28.0	17.0	45	22	4.1	281	4
2020-03-22	0.0	29.0	18.0	54	21	4.5	112	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 27.0-29.0oC and 17.0-18.0oC respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 45-54% and 21-25% respectively. Wind direction is mainly ESE & WNW with average wind speed range of 3.4-4.5 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 27.0-29.0oC, न्यूनतम 17.0-18.0oC। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 45-54 प्रतिशत और 21-25 प्रतिशत होगा, पवन गति: 3.4-4.5 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: ESE & WNW।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MAIZE	<p>Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.</p> <p>बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	<p>1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.</p> <p>1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की कटाई की जा सकती है।</p>
POTATO	<p>1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves</p> <p>1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	<p>Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.</p>

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of PAPUM-PARE(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	29.0	18.0	65	32	6.2	338	2
2020-03-19	0.0	29.0	19.0	65	33	5.5	338	3
2020-03-20	11.0	28.0	18.0	62	32	5.4	338	7
2020-03-21	12.0	28.0	18.0	59	31	6.1	338	7
2020-03-22	0.0	29.0	19.0	60	31	5.4	338	7

Weather Summary/Alert:

Mostly cloudy with possibility of moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 28.0-29.0°C and 18.0-19.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 59-65% and 31-33% respectively. Wind direction is mainly NNW with average wind speed range of 5.4-6.2 kmph.

मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 28.0-29.0°C, न्यूनतम 18.0-19.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 59-65 प्रतिशत और 31-33 प्रतिशत होगा, पवन गति: 5.4-6.2 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MAIZE	Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.
	बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.
	1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।
POTATO	1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves
	1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Complex Branch
Umiam, Meghalaya



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of SIANG(Arunanchal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	29.0	17.0	70	29	4.9	334	0
2020-03-19	0.0	29.0	17.0	72	31	5.2	338	2
2020-03-20	12.0	28.0	15.0	71	29	5.7	338	8
2020-03-21	1.0	28.0	16.0	73	35	6.0	332	7
2020-03-22	0.0	28.0	17.0	70	36	4.5	333	7

Weather Summary/Alert:

Mostly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 28.0-29.0°C and 15.0-17.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 70-73% and 29-36% respectively. Wind direction is mainly NNW with average wind speed range of 4.5-6.0 kmph.

मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 28.0-29.0°C, न्यूनतम 15.0-17.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 70-73 प्रतिशत और 29-36 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.5-6.0 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MAIZE	<p>Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.</p> <p>बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	<p>1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.</p> <p>1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।</p>
POTATO	<p>1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves</p> <p>1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	<p>Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.</p>

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of TAWANG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	1.0	12.0	4.0	71	27	7.5	68	7
2020-03-19	2.0	12.0	4.0	85	36	7.3	202	7
2020-03-20	3.0	12.0	4.0	79	30	7.8	45	7
2020-03-21	0.0	12.0	4.0	68	25	7.4	243	5
2020-03-22	2.0	12.0	4.0	74	35	6.7	63	7

Weather Summary/Alert:

Mostly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 12.0oC and 4.0oC respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 68-85% and 25-36% respectively. Wind direction is mainly ENE with average wind speed range of 6.7-7.8 kmph.

मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्का वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 12.0oC, न्यूनतम 4.0oC। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 68-85 प्रतिशत और 25-36 प्रतिशत होगा, पवन गति: 6.7-7.8 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: ENE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MUSTARD	<p>1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination</p> <p>1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	<p>1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation</p> <p>1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है</p>
APPLE	<p>1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free</p> <p>1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	<p>1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.</p>

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फ़ीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of TIRAP(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	27.0	17.0	74	35	3.8	158	3
2020-03-19	0.0	28.0	18.0	67	33	4.4	135	1
2020-03-20	1.0	27.0	17.0	62	34	3.9	154	5
2020-03-21	0.0	28.0	17.0	69	32	4.3	124	5
2020-03-22	1.0	29.0	18.0	80	31	4.6	338	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 27.0-29.0oC and 17.0-18.0oC respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 62-80% and 31-35% respectively. Wind direction is mainly SE & SSE with average wind speed range of 3.8-4.6 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 27.0-29.0oC, न्यूनतम 17.0-18.0oC। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 62-80 प्रतिशत और 31-35 प्रतिशत होगा, पवन गति: 3.8-4.6 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: SE & SSE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MAIZE	<p>Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.</p> <p>बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	<p>1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.</p> <p>1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।</p>
POTATO	<p>1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves</p> <p>1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	<p>Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.</p>

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of UPPER-SIANG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	24.0	13.0	63	24	6.4	150	1
2020-03-19	2.0	23.0	13.0	64	26	6.4	248	5
2020-03-20	16.0	22.0	12.0	82	26	7.2	202	8
2020-03-21	10.0	22.0	12.0	82	37	8.3	341	7
2020-03-22	1.0	24.0	14.0	66	32	6.1	338	7

Weather Summary/Alert:

Mostly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 22.0-24.0°C and 12.0-14.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 63-82% and 24-37% respectively. Wind direction is mainly NNW with average wind speed range of 6.1-8.3 kmph.

मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 22.0-24.0°C, न्यूनतम 12.0-14.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 63-82 प्रतिशत और 24-37 प्रतिशत होगा, पवन गति: 6.1-8.3 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गों को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MUSTARD	1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination
	1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation
	1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
APPLE	1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free
	1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
--------------------	---------------------------

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of UPPER-SUBANSIRI(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	26.0	14.0	71	30	4.3	340	6
2020-03-19	1.0	26.0	14.0	73	30	4.6	340	6
2020-03-20	4.0	25.0	14.0	76	30	5.0	335	6
2020-03-21	12.0	24.0	13.0	80	38	5.4	342	8
2020-03-22	1.0	25.0	15.0	74	38	4.2	339	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 24.0-26.0°C and 13.0-15.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 71-80% and 30-38% respectively. Wind direction is mainly NNW with average wind speed range of 4.2-5.4 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 24.0-26.0°C, न्यूनतम 13.0-15.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 71-80 प्रतिशत और 30-38 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.2-4.5 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MUSTARD	1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination
	1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation
	1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
APPLE	1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free
	1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
--------------------	---------------------------

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of WEST-KAMENG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	4.0	21.0	10.0	89	44	7.3	338	6
2020-03-19	3.0	21.0	10.0	92	61	5.9	333	6
2020-03-20	6.0	20.0	9.0	94	68	6.6	158	6
2020-03-21	13.0	20.0	9.0	90	68	7.2	158	8
2020-03-22	5.0	22.0	11.0	96	66	5.8	342	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 20.0-22.0°C and 9.0-11.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 89-96% and 44-68% respectively. Wind direction is mainly NNW & SSE with average wind speed range of 5.8-7.3 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 20.0-22.0°C, न्यूनतम 9.0-11.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 89-96 प्रतिशत और 44-68 प्रतिशत होगा, पवन गति: 5.8-7.3 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW & SSE |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MUSTARD	1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination
	1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation
	1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
APPLE	1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free
	1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
--------------------	---------------------------

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of WEST-SIANG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	29.0	17.0	67	27	4.6	338	1
2020-03-19	2.0	29.0	17.0	69	28	4.9	334	6
2020-03-20	16.0	27.0	15.0	72	27	5.7	338	7
2020-03-21	2.0	28.0	16.0	78	39	7.2	338	6
2020-03-22	1.0	28.0	17.0	69	35	5.0	335	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 27.0-29.0°C and 15.0-17.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 67-78% and 27-39% respectively. Wind direction is mainly NNW with average wind speed range of 4.6-7.2 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 27.0-29.0°C, न्यूनतम 15.0-17.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 67-78 प्रतिशत और 27-39 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.6-7.2 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MAIZE	<p>Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.</p> <p>बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	<p>1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.</p> <p>1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।</p>
POTATO	<p>1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves</p> <p>1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of ANZAW(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	24.0	13.0	76	33	9.0	68	1
2020-03-19	0.0	23.0	13.0	80	33	8.9	45	1
2020-03-20	5.0	22.0	12.0	74	35	8.8	68	8
2020-03-21	4.0	22.0	12.0	49	31	11.3	71	8
2020-03-22	1.0	24.0	14.0	70	35	8.6	63	7

Weather Summary/Alert:

Mostly sunny with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 22.0-24.0°C and 12.0-14.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 49-80% and 31-35% respectively. Wind direction is mainly ENE with average wind speed range of 8.6-11.3 kmph.

मुख्यतः धूप रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 22.0-24.0°C, न्यूनतम 12.0-14.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता :49-80 प्रतिशत और 31-35 प्रतिशत होगा, पवन गति: 8.6-11.3 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: ENE |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	<p>1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation</p> <p>1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें</p>
MUSTARD	<p>1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination</p> <p>1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।</p>

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	<p>1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation</p> <p>1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है</p>
APPLE	<p>1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free</p> <p>1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें</p>

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<p>1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.</p> <p>1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।</p>

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	<p>1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.</p>

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फ़ीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of CHANGLANG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	27.0	17.0	41	20	5.5	116	5
2020-03-19	0.0	28.0	18.0	43	21	5.5	116	0
2020-03-20	1.0	27.0	17.0	42	20	5.4	112	6
2020-03-21	0.0	28.0	17.0	43	18	5.4	112	6
2020-03-22	0.0	29.0	18.0	48	19	5.6	112	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 27.0-29.0°C and 17.0-18.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 41-48% and 18-21% respectively. Wind direction is mainly ESE with average wind speed range of 5.4-5.6 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 27.0-29.0°C, न्यूनतम 17.0-18.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 41-48 प्रतिशत और 18-21 प्रतिशत होगा, पवन गति: 5.4-5.6 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: ESE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MAIZE	Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.
	बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.
	1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।
POTATO	1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves
	1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of DIBANG-VALLEY(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	21.0	10.0	64	27	7.9	22	6
2020-03-19	2.0	21.0	10.0	67	26	7.2	22	6
2020-03-20	21.0	20.0	9.0	68	29	8.1	26	8
2020-03-21	18.0	20.0	9.0	56	32	8.7	30	8
2020-03-22	2.0	21.0	10.0	64	30	6.8	26	6

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 20.0-21.0°C and 9.0-10.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 56-68% and 26-32% respectively. Wind direction is mainly NNE with average wind speed range of 6.8-8.7 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 20.0-21.0°C, न्यूनतम 9.0-10.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 56-68 प्रतिशत और 26-32 प्रतिशत होगा, पवन गति: 6.8-8.7 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNE |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MUSTARD	1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination
	1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation
	1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
APPLE	1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free
	1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
--------------------	---------------------------

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of EAST-KAMENG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	2.0	25.0	14.0	72	28	6.8	22	6
2020-03-19	2.0	25.0	14.0	69	34	6.3	22	5
2020-03-20	2.0	25.0	14.0	70	32	7.1	22	6
2020-03-21	6.0	23.0	13.0	67	34	7.7	22	7
2020-03-22	1.0	26.0	15.0	64	36	5.6	22	7

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 23.0-26.0°C and 13.0-15.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 64-72% and 28-36% respectively. Wind direction is mainly NNE with average wind speed range of 5.6-7.7 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 23.0-26.0°C, न्यूनतम 13.0-15.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 64-72 प्रतिशत और 28-36 प्रतिशत होगा, पवन गति: 5.6-7.7 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNE।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MAIZE	Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.
	बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.
	1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।
POTATO	1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves
	1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Research Complex for NEH Region
Arunachal Pradesh Centre, Basar-791101



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of EAST-SIANG(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	0.0	29.0	17.0	51	22	5.6	341	0
2020-03-19	0.0	29.0	17.0	53	24	5.7	338	0
2020-03-20	3.0	28.0	15.0	53	23	5.8	338	6
2020-03-21	3.0	28.0	16.0	49	24	6.4	334	6
2020-03-22	1.0	28.0	17.0	54	28	4.6	335	6

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 28.0-29.0°C and 15.0-17.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 49-54% and 22-28% respectively. Wind direction is mainly NNW with average wind speed range of 4.6-6.4 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 28.0-29.0°C, न्यूनतम 15.0-17.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 49-54 प्रतिशत और 22-28 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.6-6.4 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: NNW।

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MAIZE	Sowing may be done on clear/dry days. Recommended varieties: DA-61A, Vivek Hybrid-21, Vivek QPM-9. Before sowing seed should be treated with carbendazim @ 1g/kg of seed.
	बुआई स्पष्ट / शुष्क दिनों पर की जा सकती है। अनुशंसित किस्में: DA-61A, विवेक हाइब्रिड -21, विवेक QPM-9। बुवाई से पहले बीज को कार्बेन्डाजिम @ 1 ग्राम / किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ORANGE	1. Right time for the application of FYM/compost @ 5-10 kg per plant during clear/dry days to maintain plant health. 2. If harvesting is over, pruning of dead and diseased branches may be done.
	1. पौधा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान प्रति पौधा 5-10 किलोग्राम एफवाईएम / खाद के आवेदन का सही समय है। 2. यदि कटाई खत्म हो गई है, तो मृत और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई की जा सकती है।
POTATO	1. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 2. Regularly monitor against the Late Blight symptoms. Prominent symptoms include small, dark, circular to irregular shaped lesion in the leaves
	1. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 2. नियमित रूप से लेट ब्लाइट लक्षणों के खिलाफ निगरानी करें। प्रमुख लक्षणों में पत्तियों में छोटे, काले, गोलाकार से अनियमित आकार के घाव शामिल हैं

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
COMMON FISH	Right time for new pond excavation/old pond renovation. Manual removal of aquatic plants and liming @ 200-500 kg/ha/m depth advocated.

Fisheries(Varieties)	Fisheries Specific Advisory
	नए तालाब की खुदाई / पुराने तालाब के नवीनीकरण का सही समय। जलीय पौधों को हटाने का काम करें और चूना @ 200-500 किलोग्राम / हेक्टेयर / मीटर गहराई से लगायें।



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Complex Branch
Umiam, Meghalaya



Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-03-2020

Weather Forecast of KRA-DAADI(Arunachal Pradesh) Issued On : 2020-03-17(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-03-18	3.0	21.0	10.0	90	44	4.6	292	6
2020-03-19	4.0	21.0	10.0	91	47	4.8	296	6
2020-03-20	12.0	20.0	9.0	94	50	4.5	112	8
2020-03-21	16.0	20.0	9.0	95	77	4.9	304	8
2020-03-22	3.0	21.0	10.0	94	55	4.6	292	6

Weather Summary/Alert:

Partly cloudy with possibility of light/moderate rain. Daily maximum and minimum temperature for the following period is predicted to be 20.0-21.0°C and 9.0-10.0°C respectively. Expected morning and evening relative humidity will be 90-95% and 44-77% respectively. Wind direction is mainly WNW with average wind speed range of 4.5-4.9 kmph.

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। संभावित तापमान: अधिकतम: 20.0-21.0°C, न्यूनतम 9.0-10.0°C। सुबह और संध्या अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता : 90-95 प्रतिशत और 44-77 प्रतिशत होगा, पवन गति: 4.5-4.9 किमी प्रति घंटा, हवा की दिशा: WNW |

General Advisory:

1. Spraying should be done only on dry/clear weather 2. Obtain seeds from reputed/certified/reliable source 3. Use fertilizers/pesticides as per recommended doses for the location 4. Keep separately the newly procured livestock/poultry for some days to check any disease symptoms.

1. छिड़काव केवल सूखे / साफ मौसम पर किया जाना चाहिए 2. प्रतिष्ठित / प्रमाणित / विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करें 3. स्थान के लिए अनुशंसित खुराकों के अनुसार उर्वरकों / कीटनाशकों का उपयोग करें 4. किसी भी रोग के लक्षणों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए खरीदे गए नए पशुधन / मुर्गे को अलग से रखें।

SMS Advisory:

Cattle: FMD vaccination under vet supervision is advised.

मवेशी: पशु चिकित्सक पर्यवेक्षण के तहत एफएमडी टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
FIELD PEA	1. Harvest green pods at 4-5 days interval so as to stimulate generation of new flowers. 2. Avoid water stagnation in the field and provide proper drainage. 3. Need based foliar spray of Dinocap (0.2%) or Carbendazim 50WP (0.1%) or Propiconazole (0.1%) against Powdery Mildew on clear/dry days or using sticker in case of heavy infestation
	1. 4-5 दिनों के अंतराल पर हरी फली की कटाई करने की सलाह दी जाती है ताकि नए फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। 2. खेत में पानी के ठहराव से बचें और उचित जल निकासी प्रदान करें 3. कृपया स्पष्ट / शुष्क दिनों पर पाउडर मिल्ड्यू के खिलाफ डिनोकाप (0.2%) या कार्बेन्डाजिम 50WP (0.1%) या प्रोपीकोनाज़ोल (0.1%) की आवश्यकता आधारित पर्ण स्प्रे करें, बारिश के उपयोग के मामले में स्टीकर का उपयोग करें
MUSTARD	1. Immediately harvest mature mustard crop during clear/dry days. 2. Regular monitoring against insect/disease attack is recommended. 3. In case of flowering avoid spray of synthetic insecticides that may cause harm to honey-bees and affect pollination
	1. स्पष्ट / शुष्क दिनों के दौरान परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तुरंत करें। 2. कीट / बीमारी के हमले के खिलाफ नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है। 3. फूलों के दौरान सिंथेटिक कीटनाशकों के स्प्रे से बचें जो शहद-मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परागण को प्रभावित कर सकते हैं।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
KIWI	1. Diseased and senile branches should be removed. 2. Pruning should be done retaining 8-10 buds per branch for enhancing new flush and flowering. 3. Pruned healthy hard wood of pencil thickness size having 4-5 buds can be used as cutting for propagation
	1. रोगग्रस्त और उपजाऊ शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। 2. नए फलश और फूलों को बढ़ाने के लिए प्रति शाखा 8-10 कलियों को बनाए रखना चाहिए। 3. 4-5 कलियों वाले पेंसिल मोटाई के स्वस्थ कड़े लकड़ी को प्रसार के लिए काटने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
APPLE	1. Swab the stem with mineral oil against wooly aphid. 2. Keep the basin clean and weed-free
	1. ऊनी एफिड के खिलाफ खनिज तेल के साथ स्टेम को स्वाब करें। 2. बेसिन को साफ और खरपतवार रहित रखें

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	1. Provide Sodium bicarbonate (0.85%) as feed supplement to the cattle. 2. FMD vaccination under vet official supervision is advised.
	1. मवेशियों को पूरक आहार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट (0.85%) प्रदान करें। 2. पशु चिकित्सक की निगरानी में FMD टीकाकरण की सलाह दी जाती है।

Poultry Specific Advisory:

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
--------------------	---------------------------

Poultry(Varieties)	Poultry Specific Advisory
CHICKEN	1. Inclusion of turmeric powder @ 10g/kg feed for prevention of coccidiosis. 2. Provide schedule vaccination under the supervision of experts. 3. Properly clean the poultry house with detergent and water and keep it dry.
	1. कोसीकोडायसिस की रोकथाम के लिए हल्दी पाउडर @ 10 ग्राम / किग्रा फीड को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। 2. विशेषज्ञों की देखरेख में अनुसूची टीकाकरण प्रदान करें। 3. पोल्ट्री हाउस को डिटर्जेंट और पानी से ठीक से साफ सूखा रखें।